

## HYDROCHLOROTHIAZIDE 5 mg/ml

Suspension orale avec sucre



### Formule pour 100 ml :

| Produits                            | Quantité        |
|-------------------------------------|-----------------|
| Hydrochlorothiazide (Esidrex® 25mg) | 20 cpr = 500 mg |
| Ora-Plus                            | 50 ml           |
| Ora-Sweet                           | Ad 100 ml       |

### Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser (355) la poudre et réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

**Expiration :** 2 mois.

**Conditionnement :** Flacon Veral 100 ml. Etiquette « Bien agiter ! » « Contient des parabènes »

**Stockage :** Frigo (2-8°C).

**Visa :** R.D, C.B

### Références :

1-CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 15/11/17 :

[http://www.chuv.ch/pharmacie/pha\\_home/pha-prestations/pha-production-pharmaceutique/pha-produits-fabriques-2.htm](http://www.chuv.ch/pharmacie/pha_home/pha-prestations/pha-production-pharmaceutique/pha-produits-fabriques-2.htm).

2-Allen LV, Erickson MA. Stability of labetalol [...]. Am J Health Syst Pharm. 1996; 53 (19): 2304-9.

3-Documentation Paddock, consulté le 15/11/17 : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.