

AMIODARONE 10 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Cordarone 200 mg cpr	5 cpr = 1000 mg
Glycérol 85 %	4 ml
Bicarbonate de Na 8.4 %	4 ml
Ora-Blend	104 g

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer finement les comprimés.
- Ajouter le glycérol et mélanger pour former une pâte lisse.
- Ajouter une partie de l'Ora-Blend par portions. Bien mélanger à chaque ajout.
- Ajouter le bicarbonate et mélanger pour former une pâte.
- Compléter avec Ora-Blend. Bien mélanger.
- Transférer dans un flacon veral.
- Fixer un embout pour seringue et fermer avec un bouchon blanc.
- Etiqueter.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml. Etiquette « Bien agiter ! » « Contient des parabènes »

Stockage : Température ambiante.

Visa : R.D, C.B

Références :

1-CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 15/11/17 :

http://www.chuv.ch/pharmacie/pha_home/pha-prestations/pha-production-pharmaceutique/pha-produits-fabriques-2.htm.