

METRONIDAZOLE 50 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Métronidazole (Flagyl 500 mg ou générique)	10 cpr = 5000 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	Ad 100 ml

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser (355) la poudre et réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par proportions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml. Etiquette « Bien agiter ! » « Contient des parabènes »

Stockage : Température ambiante.

Visa : R.D, SGA

Références :

1-Allen LV, Erickson MA. Stability of ketoconazole [...] in extemporaneously compounds oral liquids. Am J Health-Syst Pharm. 1996; 53 (17): 2073-8.

2-Documentation Paddock, consulté le 22.11.17 : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.

3-Jew Rita K. Extemporaneous Formulations, Children Hospital of Philadelphia, American Society of Health-System Pharmacist, 2003.