

OMEPRAZOLE 2 mg/ml

Suspension orale (non-aromatisée)



Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Oméprazole 20 mg	10 gélules = 200 mg
Solution sodium bicarbonate 8.4 %	Ad 100 ml

Mode opératoire :

- Utiliser un générique de l'Antra en capsules.
- Ouvrir les capsules, écraser les micro-granules et tamiser.
- Mouiller avec un peu de solution sodium bicarbonate 8.4 %.
- Compléter ad 100 ml avec la solution de sodium bicarbonate 8.4 %.
- Bien mélanger et transférer dans un flacon.

Expiration : 6 semaines non ouvert et 2 semaines après ouverture (Frigo).

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml. Etiquette « Bien agiter avant l'emploi et protéger de la lumière ! » « Contient des parabènes ».

Stockage : Frigo (2-8°C).

Visa : R.D, C.B

Références :

1-HUG Hôpitaux Universitaire de Genève : https://pharmacie.hug-ge.ch/sites/pharmacie/files/infomedic/utilismedic/omeprazole_susp_formhug.pdf.

2-Taketomo Ck et al (Ed). Pediatric And Neonatal Dosage Handbook. 18e Ed, Hudson: Lexi-Comp's, 2011 / Thomson Reuters (Ed). Neofax 2010 / Jew Rk, Mullen Rj, Soo-Hoo Winson. Extemporaneous Formulations. ASHP 2003 / Olsen Et Al. Pediatr Crit Care Med 2001;2:232-7 / Kaufman et al. JPGN 2002;34:194-8 / Johnson CE et al. Ann Pharmacother 2007;41:1954-61 /.

3-Whaley Pa et al. Stability Of Omeprazole In Syrspend SF Alka (Reconstituted). Int J Pharm Compd. 2012;16:164-6 / 4-