

| Produit | Quantité | Poids |
|----------------------|----------|---------|
| Tracleer cpr 62.5 mg | 10 cpr | ≈ 0.8 g |
| Glycérine 99.5% | 0.83 ml | ≈ 1.0 g |
| Ora Plus | 50 ml | ≈ 50 g |
| Ora Sweet | 50 ml | ≈ 63 g |

Mode opératoire :

- Broyer les comprimés dans un mortier puis tamiser la poudre obtenue.
- Ajouter la petite quantité de glycérine à la poudre et mélanger.
- Mélanger les 50 ml d'Ora Plus avec les 50 ml d'Ora Sweet afin de former un mélange 1:1.
- Ajouter 10 ml de ce mélange dans le mortier et mélanger vigoureusement afin de former une pâte visqueuse mais lisse et uniforme.
- Continuer d'ajouter des portions de 10 ml et bien mélanger après chaque ajout.
- Transférer dans le flacon veral.

Expiration : 30 jours**Conditionnement :** Flacon veral 100 ml.**Stockage :** Frigo (2-8°C) ou température ambiante (15-25°C).**Références :**

1- Nation Wide Childrens, Colombus, site consulté le 25/11/2021 :

<https://www.nationwidechildrens.org/specialties/pharmacy-services/compounding-formulas>

2- Gateway Pediatric Pharmacy Group, Formulary of Extemporaneous Oral Liquid Medications version 2, consulté le 25/11/2021

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).