

En cas de rupture de stock du FRUSOL 20mg/5ml 150ml (Rosemont) disponible chez Runge Pharma.

| Produit              | Quantité |
|----------------------|----------|
| Furosémide           | 0.400 g  |
| Trometamol           | 0.200 g  |
| Saccharine sodique   | 0.200 g  |
| Eau conservante q.s. | Ad 200 g |

**\*Formule aqua conservée 220 ml :**

- parabeni conc 10% FH 2.2 ml
- aqua purificata ad 220 ml

**Mode opératoire :**

- Tarer un bécher de 200 ml dans lequel on a introduit un petit barreau magnétique.
- Peser séparément la substance active.
- Verser environ 80 g d'eau conservante dans ce bécher et chauffer le liquide jusqu'à au moins 90°C.
- Introduire les furosémide, trometamol et saccharine sous agitation magnétique dans l'eau conservante, chauffée à une température d'au moins 90°C.
- Agiter jusqu'à dissolution complète.
- Laisser refroidir la solution jusqu'à température ambiante.
- Compléter à 200 g (= 200 ml), en tenant compte de la tare, avec de l'eau conservante.
- Conditionner immédiatement la solution dans un flacon en verre brun.

**Expiration :** 2 mois.

**Conditionnement :** Flacon veral 200 ml.

**Stockage :** Température ambiante (entre 15°C et 25°C)

**Références :**

1- Association QMP, Belgique, consulté le 12.04.2022 :

<https://www.mfk-qmp.be/fr/formules/furosemide-solution-pediatric-2-mgml>

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).

Rédigée par : SGA

Validée par : NPO

V1.0 12.04.2022

/Users/aureliemagnin/Documents/01 - MagninDesign/01 - Clients/21 - Pharma 24/Zz - Retour/2024-04-04/swisstransfer\_6a896559-f446-4160-95ac-be31c891cc1b/Furosemide 2mg.ml 200ml.docx