

ATTENTION : NE PAS CONFONDRE AVEC LE PROTOCOLE A 2 mg/ml !!

Produit	Quantité	Poids
Hydrochlorothiazide (Esidrex® 25mg)	20 cpr	≈ 2.8 g
Ora-Plus	50 ml	≈ 50 g
Ora-Sweet	Ad 100 ml	≈ 64 g

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés.
- Tamiser (355) la poudre et réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml.

Stockage : Frigo (2-8°C).

Références :

1-CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 25/11/2021 :

http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_prep_ped_hydrochlorothiazidev3.pdf

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).