Produit	Quantité	Poids
Isoniazide Ph Eur	5 g	
Acide citrique monohydraté Ph Eur	0.25 g	
Citrate de sodium Ph Eur	1.2 g	
Glycérol 85 % Ph Eur	20 ml	≈ 24 g
Aqua conservée *	Ad 100 ml	≈ Ad 106 g

***Formule aqua conservée 100 ml** :
- parabeni conc 10% FH 0.5 g
- aqua purificata ad 100 ml

Mode opératoire :

- Peser l'isoniazide dans un erlenmeyer puis y introduire la glycérine et mélanger.
- Préparer 100 ml d'eau conservée selon la formule.
- Peser le citrate de sodium et l'acide citrique dans un erlenmeyer, y ajouter 60 ml d'eau conservée et mélanger jusqu'à dissolution complète.
- Mélanger le contenu des 2 erlenmeyer ensemble puis introduire le tout dans un cylindre gradué de 100 ml.
- Compléter à 100 ml avec le solde de l'eau conservée.
- Bien agiter puis transférer dans le flacon veral.

Expiration : 3 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml.

Stockage : Température ambiante.

Références :

1- Pharmacie de l'Orangerie, Isoniazide 50 mg/ml 150 ml, protocole faxé le 19.08.2017.

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).