

Produit	Quantité	Poids
Moxifloxacin sandoz 400 mg	9 cpr	≈ 5.9 g
Ora-Plus	90 ml	≈ 90 g
Ora-Sweet	90 ml	≈ 115 g

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés.
- Tamiser (355) la poudre et réintroduire dans le mortier.
- Mélanger en portions égales les Ora-Plus et Ora-Sweet jusqu'à produire 180 ml.
- Introduire 90 ml de ce mélange dans le mortier et mélanger.
- Puis compléter avec les 90 ml restants.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 3 mois.**Conditionnement :** Flacon Veral 200 ml.**Stockage :** Température ambiante.**Références :**

1-HUG, Hôpitaux Universitaires de Genève. Moxifloxacin 20 mg/ml 60 ml

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).

Rédigée par : SGA

Validée par : AJA

V1.0 24.04.2023

/Users/aureliemagnin/Documents/01 - MagninDesign/01 - Clients/21 - Pharma 24/Zz - Retour/2024-04-04/swisstransfer_6a896559-f446-4160-95ac-be31c891cc1b/Moxifloxacin 20mg.ml 180ml.docx