

Produit	Quantité	Poids
Sotalol mepha 80 mg	6 cpr	≈ 0.9 g
Ora-Plus	48 ml	≈ 48 g
Ora-Sweet	48 ml	≈ 61 g

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser (355) la poudre et réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 48 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par proportions à la poudre et bien homogénéiser.
- Compléter à 96 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.**Conditionnement :** Flacon Veral 100 ml.**Stockage :** Température ambiante.**Références :**

1-CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, consulté le 25/11/2021 :
https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/pha/documents/pha_prep_ped_sotalolv3.pdf

2-SickKids Pharmacy, Toronto, Canada, consulté le 25/11/2021 :
<https://www.sickkids.ca/siteassets/care--services/for-health-care-providers/compounding-recipes/sotalolhcl5mgml-pharmacy-compounding-recipe.pdf>

Une analyse de risque doit être faite pour chaque fabrication selon l'OAMed annexe 3 (art. 8, al. 1 à 3).