

Oubli ou vomissement après la prise d'un immunosuppresseur : quand et comment réagir ?

Ce tableau a été conçu pour vous aider à savoir quoi faire en cas d'oubli ou de vomissement après la prise de votre traitement immunosuppresseur. Il indique le délai maximal dans lequel vous pouvez rattraper une dose oubliée ainsi que le temps après lequel il est nécessaire de reprendre votre médicament en cas de vomissement. N'hésitez pas à le garder à portée de main et à en discuter avec votre équipe soignante si vous avez des questions

Médicament	Nombre de prises habituelles par jour*	En cas d'oubli prendre le médicament antirejet dans un délai de : voir ci-dessous Puis, prendre la dose suivante à l'heure habituelle !!!	Reprendre une dose complète d'antirejet si le délai entre la prise et le vomissement est :
Advagraf™	1	12 heures	Inférieur à 30 minutes
Envarsus™	1	15 heures	Inférieur à 30 minutes
Prograf™	2	6 heures	Inférieur à 30 minutes
Cellcept™	2	6 heures	Inférieur à 30 minutes
Myfortic™	2	6 heures	Inférieur à 30 minutes
Certican™	2	6 heures	Inférieur à 60 minutes
Sandimmun Neoral™	2	6 heures	Inférieur à 30 minutes
Prednisone	1	12 heures	Inférieur à 30 minutes

*Si votre schéma de prise diffère de celui indiqué dans le tableau, veuillez consulter votre équipe soignante pour savoir comment gérer un oubli ou un vomissement