

Médicament	Demi-vie	Nb prises/24 h	En cas d'oubli prendre le médicament antirejet dans un délai de : voir ci-dessous <u>Puis, prendre la dose suivante à l'heure habituelle !!!</u>	Reprendre une dose complète d'antirejet si le délai entre la prise et le vomissement est :
Advagraf™ (tacrolimus à libération prolongée)	38±3 h, plus longue chez patients insuffisants hépatiques	1	12 heures	≤ 30 minutes
Envarsus™ (tacrolimus à libération prolongée)	38±3 h, plus longue chez patients insuffisants hépatiques	1	15 heures	≤ 30 minutes
Prograf™ (tacrolimus à libération immédiate)	23-46 h chez patients sains, 2 à 36h chez patients transplantés, plus longue chez patients insuffisants hépatiques	2	6 heures	≤ 30 minutes
Cellcept™ (mycophenolate mofetil)	18 ± 6.5 h	2	6 heures	≤ 30 minutes
Myfortic™ (mycophenolate sodium)	Mycophenolate sodium, MPA(métabolite actif) : 8 -16 h, MPAG(métabolite inactif qui peut être retransformé en MPA) : 13-17 h	2	6 heures	≤ 30 minutes
Certican™ (everolimus)	30h	2	6 heures	≤ 60 minutes
Sandimmun Neoral™ (ciclosporine)	10-27h	2	6 heures	≤ 30 minutes
Prednisone	2-3h	1	12 heures	≤ 30 minutes

F:\Outils de validation\Transplantation\tableau oubli et vomissements sources.docx

ciclosporine	https://www.chu-nantes.fr/questions-sur-les-medicaments-immunosuppresseurs-neoral-sandimmun-ciclosporine	27.06.2024	x	x
ciclosporine	https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/2022-10/307-1-cyclosporine-neoral_1.pdf	18.07.2024	x	x
prednisone	https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/info?lang=fre&code=4736	27.06.2024	x	
prednisone	https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/85B629/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DOPLICATIONSHIELDSYNC/72D0E5/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=prednisone&UserSearchTerm=prednisone&SearchFilter=filterNone&navitem=searchGlobal#	27.06.2024	x	
prednisone	https://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/cortancyl_1366120736360.pdf	27.06.2024	x	x